

Pakketvoorwaarden
A15a Wintervoedselakker
Versie 2023

Beschrijving

Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden ook dekking.



Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart uit zomergraan, wintergraan, kruiden of een combinatie van deze gewassen.

Aanvullende beheervorschriften

- De beheereenheid dient jaarlijks voor minimaal 75% tussen 1 maart en 30 april te worden ingezaaid met een door het collectief voorgeschreven zaadmengsel.
- Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 1 maart van het daarop volgende jaar. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. Indien bewerkingen nodig zijn kan dit alleen met toestemming van het collectief.
- Indien de beheereenheid als rand wordt uitgevoerd heeft de rand een gemiddelde breedte van minimaal 9 meter, liever breder. Als de beheereenheid volvelds wordt ingevuld geldt in beginsel een maximale oppervlakte van 2 hectare.
- Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b 'kruidenrijke akkerrand op bufferstrook' ingetekend.
- Bemesting van de beheereenheid met vaste graasdiermest is toegestaan buiten de rustperiode.
- Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) mechanisch of chemisch worden bestreden.
- Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker.
- Het [monitoringsplan](#) (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden.

Vergoeding

€ 2.700,00 per ha

Verplicht zaadmengsel

Samenstelling graan-akkerfloramengsel Wintervoedsel		
Soort		kg/ha
Granen; zaaidichtheid 115 kg/ha		
Zomertarwe	<i>Triticum</i>	55
Gerst	<i>Hordeum vulgare</i>	55
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5
Akkerflora; zaaidichtheid 1 kg/ha		
Korenbloem (wild)	<i>Centaurea cyanus</i>	0,3
Gewone Klapproos (wild)	<i>Papaver rhoeas</i>	0,2
Gele ganzenbloem (wild)	<i>Chrysanthemum segetum</i>	0,25
Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	0,25
Toegevoegd mag worden:		
Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	max 10 kg/ha
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	max 0,2 kg/ha
Grote kaardebol	<i>Dipsacus fullonum</i>	max 0,2 kg/ha
Triticale ; dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	<i>Triticale</i>	max 20 kg/ha
Oude rogge; dan gerst verminderen met gelijke hoeveelheid	<i>Secale multicaule</i>	max 25 kg/ha
<p>Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk verschillende soorten toe te voegen. Een gevarieerd mengsel zorgt voor een spreiding aan beschikbaarheid van zaden en dus voedsel.</p>		