

## **Pakketvoorwaarden A13b3    Zilte hooilanden**

Versie 2019

### **Beschrijving**

Voor Zeeland zijn zilte graslanden en kreekgraslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Het gaat om 'ouderwetse' hooilanden met een pollige structuur en verspreid voorkomende orchideeën en kruiden. Karakteristiek zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem. Op vochtigere stukken kunnen kamgraslanden ontstaan. Deze waardevolle hooilanden kunnen met goed beheer een belangrijke bijdrage leveren aan biotopen van vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige zaden van kruiden, alsmede de insecten die op bloemen afkomen zijn een voedselbron. De open, ijle structuur van de vegetatie kan schuilgelegenheid bieden.

### **Doel**

Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloemrijke, insectenrijke biotopen.

### **Doelsoorten Zeeland**

Gele kwikstaart, patrijs, graspieper, veldleeuwerik, noordse woelmuis, bontbekplevier, kluut, Kievit, scholekster.



### **Beheereisen**

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid ten behoeve van bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie volgende pagina) zijn in steekproefgebied (transect) aanwezig in het groeiseizoen.
- Na 1 juni wordt het gewas minimaal twee keer gemaaid en afgevoerd (gehooïd). Een eventueel 3<sup>e</sup> keer hooien is toegestaan. In overleg met ecooog collectief is maatwerk mogelijk.
- Beweiding is van 1 maart tot 15 augustus niet toegestaan. Tussen 15 augustus en 1 oktober is lichte nabeweiding toegestaan met maximaal 1,5 GVE/ha.

### **Aanvullende beheervorschriften**

- Het pakket kan alleen afgesloten worden op een grasland met zilte kwel. Bovendien moet het gaan om een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief.
- De aanwezige structuur (hoogte, laagte, greppels) dient in stand gehouden te worden en zo nodig uitgebaggerd en/of hersteld te worden, zodat er weer voldoende overgangen zijn tussen nat en droog, zout en zoeter.
- Dit pakket wordt bij voorkeur gecombineerd met het pakket A3 plas dras. Het pakket A3 plas dras is bedoeld voor tijdelijk of semi permanent onder water staande stukken grasland.
- De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle knotbomen, poelen, struweel, een terrein van een natuurbeherende instantie en/of een andere vergelijkbare gecontracteerde

beheereenheid van het collectief. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de beheerder binnen 2 jaar na afsluiten van het beheercontract inrichtingsmaatregelen treffen om de locatie in potentie geschikt te maken voor doelsoorten. Deelnemer stelt daartoe vooraf een verbeterplan op met de inrichtingsmaatregelen en legt dit ter goedkeuring voor aan het collectief.

- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
- Niet in het donker of schemer maaien en van binnen naar buiten maaien, bij voorkeur stukje laten staan.
- De aanwezige vogels moeten worden beschermd tijdens maaiwerkzaamheden.
- Klepelen is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
- Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.

### **Pakket**

#### **A13b3 Zilte hooilanden**

Vergoeding deelnemer: € 1124,22 per hectare.

### **Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13b3**

#### **Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer**

**De meest voorkomende soort op agrarische percelen/randen die matig of niet bemest worden\***

<b>Nederlandse naam</b>
Achillea soorten (o.a. Duizendblad)
Madeliefje
Pinksterbloem
Knoopkruid
Hoornbloemsoorten (o.a. gewone hoornbloem)
Hondsdrif
Gewoon biggenkruid
Leeuwentandsoorten (o.a. herfstleeuwetand)
Gewone margriet
Rolklaversoorten (o.a. gewone rolklaver en moerasrolklaver)
Echte koekoeksbloem
Smalle weegbree
Boterbloemsoorten m.u.v. blaartrekkende boterbloem (o.a. kruipende boterbloem en scherpe boterbloem)
Zuring soorten m.u.v. ridderzuring (o.a. veldzuring)
Paardenbloem
Klaversoorten (o.a. witte en rode klaver)
Ereprijssoorten
Wikkesoorten, m.u.v. voederwikke

\* Op de website *Portaal Natuur en Landschap* staat de totale lijst met indicatorsoorten (<http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf>)

### **Bijlage 2: EU Omreken tabel grootvee-eenheden (GVE's )**

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden	1,0 GVE
Runderen vanaf 6 maanden, maar niet ouder dan 2 jaar	0,6 GVE
Runderen jonger dan 6 maanden	0,4 GVE

Schape, lammeren en geiten	0,15 GVE
Fokzeugen meer dan 50 kg	0,5 GVE
Andere varkens	0,3 GVE
Legkippen	0,014 GVE
Ander pluimvee	0,03 GVE

nb: bij berekenen van het aantal dieren moet naar beneden afgerond worden.