

VELDLEEUWERIK, ± 18 CM



Leefgebied: Open gebied. Mijd opgaande elementen, zoals bosranden en bebouwing.


Uiterlijk: Gestreepte bruine bovendelen, korte kuif die niet altijd zichtbaar is, witte buitenste staartpennen. In vergelijking met graspieper een duidelijk contrast tussen witte buik en gespikkelde borst. In vlucht spitse vleugels en gevorkte staart.

Geluid: Lange, trillende zang die wordt uitgevoerd terwijl de vogel recht omhoog fladdert en blijft hangen in de lucht.

Gedrag: Vliegt in rukjes. Eet insecten in voorjaar en zaden en blad van onkruiden in winter. Maakt nest in goed verborgen kuiltje van plantenresten op de grond in akkergewassen of grasland, wel in open veld.

Broedt vanaf eind maart t/m augustus. 2 tot 3 legsels per jaar nodig om sterfte te compenseren. Eieren worden in 14 dagen uitgebroed en na 8 dagen verlaten de jongen het nest. 10 dagen later kunnen ze pas vliegen. Ouders voeren de jongen met insecten. Totale broedcyclus 45 dagen.

GRASPIEPER, ± 15 CM



Leefgebied: Open gebied. Vaak aan randen, dijken en slootkanten.


Uiterlijk: Gestreepte bruine bovendelen, heel dunne snavel, witte buitenste staartpennen en opvallende oogring. In tegenstelling tot veldleeuwerik, flanken van de buik zwaar gestreept. In vlucht ronde vleugels.

Geluid: Zingt regelmatig vanaf weidepalen, prikkeldraad of in vlucht. Simpele 'fiet', 1 tot 5 keer herhaald.

Gedrag: Vliegt met enkele slagen, en dan boogje. Vaak laag boven de grond. Eet voornamelijk insecten (langpootmuggen), in winter ook zaden. Nest is een kommetje van droog gras op de grond, goed verborgen in de vegetatie.

Broedt vanaf eind maart t/m augustus. 2 legsels per jaar. Eieren worden in 13 dagen uitgebroed en na 14 dagen kunnen jongen vliegen, maar verlaten het nest vaak voortijdig. Worden daarna nog 14 dagen door ouders gevoerd met insecten.

PATRIJS, ± 30 CM



Leefgebied: Kleinschalig agrarisch landschap. Vooral akkers met dijken, struweel en ruigteranden.


Uiterlijk: Hoenderachtige, bruin met grijs gestreept kleed met grijze borst. Keel en gezicht oranjebruin en donkerbruine vlek op buik. Bij man veel groter dan bij vrouw. Tijdens de vlucht valt roodachtige staart op. Kuikens nauwelijks te onderscheiden van fazantkuikens.

Geluid: Mechanisch 'kar-wit', 'kar-wit'.

Gedrag: Standvogel. Leeft buiten broedseizoen in groepen (kluchten) op stoppelvelden en grasachtige overhoeken. Nestelt in ruige vegetatie zoals akkerranden, bermen en in vegetatie onder struwelen en hagen. Man houdt in de buurt van het nest de wacht. Meest actief in de ochtend- en avondschemering. Volwassen patrijzen eten vooral zaden en groene plantendelen, ook wel insecten. De kuikens zijn volledig aangewezen op insecten en zoeken zelf voedsel.

Broedt vanaf eind april t/m juni. 1 legsel met veel eieren (13-16). Eieren worden binnen 23-25 dagen uitgebroed. De jongen stappen meteen het nest uit en zijn na 14 dagen vliegvlug. Na zo'n 5 weken zijn ze zelfstandig.

GELE KWIKSTAART, ± 16 CM



Leefgebied: Open gebied. Akkers, weilanden en vochtige graslanden.

Uiterlijk: Man heeft groen-bruine rug en helder gele buik en borst, grijze kop met witte wenkbrouwstreep. Vrouw is valier gekleurd.

Geluid: Roep is een rijk 'tsiep'

Gedrag: Wipt regelmatig met staart (kwikken) en gebruikt paaltjes en verhogingen (bijv. grondhoop) als uitkijkpost. Eet uitsluitend insecten en overwintert in Afrika. In Nederland tussen april-oktober. Vaak foeragerend tussen vee te vinden. Wordt daarom ook wel 'koeienwachter' genoemd. Broedt in goed verborgen grondnest in akker en graslanden.

Broedt vanaf eind april t/m juli. 1 of 2 legsels per jaar. Eieren worden binnen 13 dagen uitgebroed. De jongen blijven 10-13 dagen op het nest en worden gevoerd door ouders met insecten. Daarna kunnen ze binnen enkele dagen goed vliegen.